

KUK Checkliste Anti-Amyloid-Antikörper

Name Patient:in	VersNr. / Geburtsdatum			
Telefonnummer	Adresse			
Betreuer:er Facharzt:in				
	JA	NEIN	Kommentar	
Anamnese	Kontraindikation für Magnetresonanztomographie (z.B. Herzschrittmacher, Klaustrophobie, Metalle)			
	Dauerhafte Einnahme einer oralen Antikoagulation (dOAK, Marcoumar, ...)			
	Bekannte Gerinnungsstörung mit erhöhter Blutungsneigung (inkl. Thrombozyten < 50 G/L, INR > 1,5)			
Schwere systemische rheumatologische Erkrankungen oder systemische Behandlung mit Immunsuppressiva, Immunglobulinen oder monoklonalen Antikörpern.				
Schwere, unkontrollierte Begleiterkrankungen				
Z.n. TIA oder ischämischer Schlaganfall in den letzten 12 Monaten				
Z.n. hämorrhagischem Schlaganfall				
Epilepsie				
bekanntes autosomal dominant vererbtes Alzheimerkrankheit oder Trisomie 21				
bekannt APO-E ε4 homozygot				
Schwere Depression, schwere psychiatrische Begleiterkrankungen				
Schwangerschaft bzw. Stillzeit				
	JA	NEIN	Kommentar	
Basisdaten	Klinisch leichte neurokognitive Störung oder leichtgradige Demenz und V.a. Alzheimerkrankheit			
	MMSE 20-30 Punkte			
	Eine andere Erkrankung trägt wesentlich zur kognitiven Beeinträchtigung bei			
	JA	NEIN	Kommentar	
	Partner:in oder Angehörige:r die;der den:die Patienten:in während der Therapie unterstützt			
	Patient:in und Angehörige sind im Stande die Voraussetzungen, Nutzen und Risiko einer Anti-Amyloid-Antikörper Therapie zu verstehen			
	Patient:in ist mit den Voraussetzungen bzw. dem Ablauf der Anti-Amyloid-Antikörper Therapie einverstanden			

Anmeldung per Mail an:
neu.demenz@kepleruniklinikum.at

Name

Geburtsdatum

		JA	NEIN	Kommentar
Bildgebung	Cerebrale Amyloid Angiopathie			
	Eine oder mehrere größere (>10mm) Blutungen			
	mehr als 4 Mikroblutungen			
	Superficielle Siderrhose			
	Vasogenes Ödem			
	ausgeprägte, flächige Leukencephalopathie (Fazekas 3)			
	Mehr als 2 lakunäre Infarkte oder ein Territorialinfarkt > 1 cm			
	Hirntumore außer Meningeome			
	Bekannte cerebrale Aneurysmen oder andere Gefäßmissbildungen (außer kleine venöse Fehlbildungen)			

Rote Felder = Kontraindikation für Therapie mit einem Anti-Amyloid-Antikörper

Anmeldung per Mail an:
neu.demenz@kepleruniklinikum.at